

Prevenzione e trattamento (nota 96)


- **Gravidanza o allattamento**
- **Ricoverati cronici**
- **Osteoporotici o osteopatici non rientranti nella nota 79**
- **Terapia con farmaci inibitori della VD***
- **Malassorbimento****
- **Osteoporosi, Paget (certi)**
- **Osteomalacia (dolori o debolezza cosce e glutei)**
- **Dolori diffusi cronici**
- **Cadute immotivate**

**Terapia con
VD continua;
non è necessario
effettuare
il dosaggio**

*: **Antiepilettici, Glucocorticoidi, Antiretrovirali, Antimicotici, Colestiramina, Orlistat, ecc**

** : **Fibrosi cistica, Malattia celiaca, Morbo di Crohn, Chirurgia bariatrica, ecc**

Quando dosare la Vitamina D (nota 96)



- **Vit. D <20 + sintomi** (astenia, mialgie, dolori, cadute)
- **Osteoporosi in candidati a terapia della nota 79 che devono correggere ipovitaminosi "D"**
- **Previsione o già in terapia con farmaci interferenti la Vit. D***
- **Malassorbimento**

- **Dolori ossei, lombosacrali, pelvici o agli arti inferiori**
- **Propensione alle cadute**
- **Osteoporosi, osteomalacia, Paget che necessitano di VD o farmaci della nota 79**
- **PTH elevato e Calcio basso**
- **Iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D**

*: Antiepilettici, Glucocorticoidi, Antiretrovirali, Antimicotici, Colestiramina, Orlistat, ecc

** : Fibrosi cistica, Malattia celiaca, Morbo di Crohn, Chirurgia bariatrica, ecc

Terapia con Vitamina D (nota 96)

